



PROVA N. 2


B

1. **La causa più frequente di delirium nel paziente anziano istituzionalizzato è:**
A Infarto cerebro-vascolare acuto
B Crisi ipertensiva
C Tumore del sistema nervoso centrale
D Tossicità da farmaci
2. **Sono sintomi ostruttivi di ipertrofia prostatica benigna tutti, tranne:**
A difficoltà nell'iniziare la minzione
B riduzione della forza del flusso urinario
C incontinenza da urgenza
D ritenzione urinaria
3. **Qual è il farmaco di prima scelta nel ridurre l'incidenza di ictus, infarto miocardico e morte in pazienti con Attacco Ischemico Transitorio?**
A dipiridamolo
B ticlopidina
C acido acetilsalicilico
D eperidina
4. **Quali scale, tra quelle elencate, sono utilizzate per indagare le funzioni cognitive nell'anziano?**
A MMSE(Mini Mental State Examination)
B IADL(Instrumental Activity Dayling Living)
C GDS(Geriatric Depression Scale)
D nessuna delle elencate
5. **Dal punto di vista clinico la malattia di Parkinson viene spesso confusa con:**
A malattia di Alzheimer
B tremore indotto da farmaci
C demenza multininfartuale
D ictus
6. **Quale tra i seguenti disinfettanti non è indicato per sanificare in caso di contaminazione da Covid 19?**
A Alcool
B Derivati del cloro
C Antibatterico
D Perossido di idrogeno
7. **Quale tra le seguenti non è una caratteristica dei contenitori per lo smaltimento di aghi e taglienti ?**
A Essere a tenuta stagna
B Essere resistenti agli urti
C Avere un sistema di chiusura irreversibile
D Essere almeno in parte trasparenti
8. **Di cosa NON si occupa il medico competente:**
A Diagnosi e cura
B Sorveglianza sanitaria
C Effettua le visite periodiche e quelle al bisogno
D Definisce l'idoneità alla mansione

RV
1
1
P

9. **Quale tra questi segni è indice di iperammoniemia:**
A rigidità
B astenia
C confusione mentale
D inappetenza
10. **Quali tra le seguenti patologie è prevenibile con la vaccinazione?**
A Epatite B
B Epatite A
C Epatite C
D Hiv
11. **Secondo l'OMS quale tra i seguenti interventi è più efficace nella prevenzione di punture accidentali?**
A utilizzo di aghi di sicurezza
B non reincapucciare l'ago
C utilizzo degli Halibox
D utilizzo di guanti in nitrile
12. **Per valutare la presenza di dispnea il primo dato da rilevare è:**
A percezione riferita dal paziente circa la sua difficoltà di respiro
B frequenza respiratoria
C colorito cutaneo a livello delle mucose, in particolare per rilevare cianosi o pallore
D saturazione dell'ossigeno
13. **Nell'assistere un paziente ICTUS acuto quale posizione è suggerita e perché (linee guida SPREAD, 2012)?**
A posizione del capo non più elevata di 20-30° rispetto al piano del letto per aumentare il flusso ematico intracranico
B posizione del capo elevata di 30° rispetto al piano del letto per ridurre i fattori in grado di aumentare la pressione intracranica
C posizione supina allo stesso livello del piano del letto per equilibrare il flusso ematico intracranico e ridurre l'edema
D posizione del antitredelenburg di massimo 20° per favorire la perfusione cerebrale e ridurre il rischio di ipertensione intracranica
14. **Durante il passaggio delle informazioni tra un turno e l'altro l'Infermiere segnala che il sig. Mario ha le pupille miotiche. Come sono le pupille del paziente?**
A dilatate
B ristrette
C asimmetriche
D simmetriche
15. **Un tirocinante OSS (Operatore Sociosanitario) deve eliminare una sacca con urine color giallo paglierino. Dopo averla vuotata in quale tipologia di contenitore per rifiuti la smaltirà?**
A assimilabile agli urbani
B pericolosi a rischio infettivo
C pericolosi non a rischio infettivo
D con specifiche modalità di smaltimento
- 

16. **Secondo le linee guida europee per la rianimazione caldopolmonare nell'adulto (erc 2021) la prima cosa che deve verificare l'infermiere in caso di emergenza è:**
A la pervietà delle vie aeree della vittima
B le condizioni di sicurezza ambientale
C la presenza di polso carotideo della vittima
D di avere a disposizione un DAE
17. **Per ascite si intende una raccolta di liquido:**
A nella cavità peritoneale
B nella cavità ascellare
C nella cavità toracica
D nello spazio intratecale
18. **L'afasia espressiva è caratterizzata da:**
A incapacità totale sia del linguaggio verbale sia in quello scritto
B linguaggio limitato, articolazione rallentata e grammatica ridotta
C linguaggio fluente, ben articolato e contenuti disorganizzati
D disturbo del linguaggio risultante da debolezza del controllo motorio, paralisi e scoordinazione
19. **In pazienti con chetoacidosi diabetica è di importanza critica reintegrare il:**
A magnesio
B bicarbonato
C potassio
D calcio
20. **Per prevenire l'insorgenza del "piede diabetico" la persona deve essere educata a:**
A ispezionare i piedi due volte la settimana
B lavare i piedi con acqua molto calda
C tagliare le unghie corte
D asciugare bene fra le dita con panno morbido
21. **Con il termine aprassia si intende l'incapacità della persona:**
A a riconoscere gli oggetti, percepiti come "presenze" ma non come "concetti"
B a compiere gesti o movimenti volontari finalizzati
C di camminare autonomamente senza l'uso di ausili
D di parlare e comprendere il significato delle parole dette o scritte da altri
22. **Le precauzioni standard vengono applicate:**
A ai pazienti HIV o HCV-HBV positivi o con fattori di rischio per HIV, HCV e HBV
B ai pazienti che non si conoscono bene e si presume abbiano avuto comportamenti a rischio
C a tutti i pazienti, indipendentemente dalla loro diagnosi o presunto stato di infezione
D quando la via di trasmissione dell'infezione avviene per contatto
23. **Un ospite di 74 anni, affetto da diabete mellito di tipo 2 insulinodipendente chiama l'Infermiere perché avverte senso di spossatezza, cefalea e disturbi della visione. Rispetto ai sintomi riferiti, quale situazione identifica l'Infermiere?**
A chetoacidosi diabetica
B crisi ipoglicemica
C crisi iperglicemica
D sindrome iperglicemica iperosmolare
- 

24. **Quale intervento è indicato realizzare per facilitare la continenza vescicale in una signora con compromissione cognitiva , per ridurre gli episodi di incontinenza?**
A posizionare la padella a letto alla chiamata della signora
B posizionare un pannolone di sicurezza
C ricordare alla signora di andare in bagno ogni 2 ore
D suggerire di ridurre i liquidi assunti fra i pasti
25. **Nell'addestrare una persona con difficoltà nella vestizione, per inabilità ad un emisoma, quali istruzioni sono più corrette?**
A iniziare ad indossare la camicia dall'arto lesa e poi procedere con l'arto sano; nella svestizione iniziare dall'arto sano e poi procedere verso quello lesa
B iniziare ad indossare la camicia dall'arto sano e poi procedere con l'arto lesa; nella svestizione iniziare dall'arto lesa e poi procedere verso quello sano
C iniziare ad indossare la camicia dall'arto lesa e poi procedere con l'arto sano; nella svestizione procedere con lo stesso ordine
D iniziare ad indossare la camicia o pantalone sempre dall'arto sano mentre nella svestizione l'ordine è indifferente
26. **Il figlio della signora Giovanna, ospite di una Struttura Residenziale chiede se possono essere applicate le spondine al letto della madre, perché teme che di notte possa cadere e questo gli dà tranquillità. L'Infermiere risponderà:**
A "Sì, è utile applicare le spondine perché riducono le cadute e i traumi, è necessario solo che Lei dia il consenso alla procedura, firmando l'apposito modulo"
B "E' meglio non utilizzare le spondine perché non riducono le cadute e aumentano il rischio di traumi, possiamo invece chiedere al medico di prescrivere una terapia sedativa che favorisca il sonno"
C "Sì è utile applicare le spondine in quanto riducono le cadute; poiché però aumentano i rischi di trauma, sarebbe opportuno che lei si fermi durante la notte per una maggiore sorveglianza"
D "E' meglio non usare le spondine perché non riducono le cadute e aumentano il rischio di traumi: è opportuno posizionare il letto ad una altezza ridotta e controllare la signora frequentemente"
27. **Nell'istruire una persona sui prodotti più adatti per l'igiene orale quale tra le seguenti indicazioni è più corretta?**
A i colluttori medicati contenenti clorexidina vanno utilizzati in modo costante e a lungo termine per il loro effetto antiplacca
B il sodio bicarbonato è consigliato per l'igiene quotidiana del cavo orale in quanto riduce la proliferazione batterica
C i prodotti contenenti fluoro sono indicati per la prevenzione delle carie dentali e hanno proprietà antiplacca
D il collutorio idroalcolico contenente fluoro è consigliato alle persone con stomatite da chemioterapia per ridurre la placca e per il potere antibatterico
28. **Nella comunicazione si distinguono un contenuto manifesto e un contenuto latente. Quale di queste due affermazioni esprime il corretto rapporto tra i due?**
A il contenuto latente è l'elemento patologico, quello manifesto è invece quello fisiologico
B i due contenuti si autoescludono a vicenda: se è presente l'uno è assente l'altro
C i due contenuti sono paralleli e onnipresenti in ogni comunicazione
D i due contenuti sono in rapporto gerarchico: l'uno domina l'altro
- 

29. **Durante le cure personali l'anziano affetto da demenza può reagire con agitazione e aggressività. Quale approccio è consigliato per prevenire queste reazioni?**

A lavare le parti del corpo da quelle più sensibili a quelle meno; accettare comportamenti reattivi e non contrastare, usare prodotti delicati e profumati per aumentare il rilassamento e il comfort

B coprire la persona con l'asciugamano, mantenere caldo il corpo ad eccezione delle singole parti che si stanno lavando, accettare comportamenti reattivi e non contrastare

C evitare di avvertirlo della necessità di fare il bagno molto tempo prima, dimostrarsi accoglienti ma decisi rispetto a quello che si vuole fare, durante il bagno fare qualche massaggio sulla schiena

D utilizzare un atteggiamento di fermezza di fronte al rifiuto e non commentare le sue reazioni, usare prodotti molto schiumosi, evitare distrazioni e dedicarsi al suo corpo


30. **Il Glasgow Coma Scale (GGS) prende in esame i seguenti elementi:**

A apertura occhi, risposte verbali, risposte motorie


B chiusura occhi, risposte verbali, deficit neurologici

C apertura occhi, analisi della memoria, deficit di lato

D diametro delle pupille, risposte verbali, risposte motorie



1



RN



